



Influenza aviar altamente patógena

INFORMACIÓN PARA DUEÑOS DE MASCOTAS

Algunos virus de la influenza aviar pueden afectar a los animales de compañía, como gatos, perros y algunas mascotas de bolsillo. Desde que comenzó el actual brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP), muchos gatos domésticos (incluidos los gatos domésticos, de granja y salvajes) se han infectado y se han enfermado gravemente o han muerto a causa de la influenza aviar altamente patógena. Las mascotas pueden estar expuestas al virus y posiblemente infectarse por contacto directo con aves acuáticas infectadas (o su entorno) o por consumir carne cruda contaminada o leche cruda (no pasteurizada).

Síntomas

La infección puede causar una enfermedad de leve a grave, incluso la muerte. Dado que los síntomas en las mascotas pueden parecerse a los de otras enfermedades respiratorias o neurológicas, se debe considerar la IAAP, especialmente si existen factores de riesgo conocidos. Los factores de riesgo de la infección por IAAP en mascotas incluyen los siguientes:

- Exposición reciente a animales o locales que se sabe que están infectados o contaminados con la influenza aviar altamente patógena
- Exposición o ingestión reciente de aves muertas (especialmente aves acuáticas silvestres)
- Exposición o ingestión reciente de carne cruda
- Exposición o ingestión reciente de leche cruda de vaca o calostro

Los síntomas de la influenza aviar altamente patógena en las mascotas son más conocidos en los gatos, pero se pueden observar signos similares en otras especies de mascotas e incluyen:

- Fiebre
- Letargo
- Inapetencia
- Conjuntivitis
- Secreción ocular y/o nasal
- Dificultad para respirar
- Signos neurológicos (por ejemplo, temblores, convulsiones, falta de coordinación o ceguera)
- Muerte

Prevención

Los animales de compañía pueden infectarse con influenza aviar si comen aves infectadas (u otros animales infectados como ratones), carne cruda contaminada (incluidos alimentos/golosinas crudas para mascotas) o leche cruda contaminada. Los animales de compañía también pueden infectarse por la exposición directa a ambientes contaminados u otros animales infectados, aunque el riesgo actual de transmisión de mamífero a mamífero se considera bajo en la mayoría de las situaciones.

- No alimente a las mascotas con carne cruda o poco cocida, incluidas dietas a base de carne cruda o liofilizada, golosinas para mascotas o productos animales
- No alimente a las mascotas con leche cruda (sin pasteurizar) ni calostro
- Mantenga a las mascotas alejadas de las aves silvestres, las aves de corral y el ganado (especialmente en áreas con brotes conocidos de H5N1)
- Evite que las mascotas coman aves u otros animales salvajes
- Si interactúa con animales enfermos o muertos que puedan albergar el virus de la influenza aviar, cámbiese la ropa y los zapatos y lávese bien las manos
- Si sospecha que su mascota puede estar infectada con influenza aviar, contacte con su veterinario inmediato