

Códigos de diagnósticos de salud conductual para elegibilidad del programa YSHCN

<p>Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i></p>	<p>Descripción del código de diagnóstico ICD-10</p>
F70	Discapacidades intelectuales leves
F71	Discapacidades intelectuales moderadas
F72	Discapacidades intelectuales graves
F73	Discapacidades intelectuales profundas
F78	Otras discapacidades intelectuales
F78.A1	Discapacidad intelectual relacionada con SYNGAP1
F78.A9	Otra discapacidad intelectual relacionada con la genética
F79	Discapacidades intelectuales no especificadas
F80.1	Trastorno del lenguaje expresivo
F80.2	Trastorno del lenguaje receptivo-expresivo combinado
F80.4	Retraso en el desarrollo del habla y el lenguaje debido a pérdida auditiva

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F80.81	Trastorno de la fluidez del habla con inicio en la infancia (tartamudez)
F81	Trastornos específicos del desarrollo de habilidades escolásticas
F81.0	Trastorno específico de lectura
F81.2	Trastorno de las matemáticas
F81.8	Otros trastornos del desarrollo de habilidades escolásticas
F81.81	Trastorno de la expresión escrita
F81.89	Otros trastornos del desarrollo de habilidades escolásticas
F81.9	Trastorno del desarrollo de habilidades escolásticas, no especificado
F82	Trastorno específico del desarrollo de la función motora
F84.0	Trastorno del espectro autista
F84.3	Otro trastorno desintegrativo de la infancia
F84.5	Síndrome de Asperger
F88	Retraso del desarrollo global
F90	Trastornos por déficit de atención e hiperactividad
F90.0	Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, predominantemente del tipo inatento

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F90.1	Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, predominantemente del tipo hiperactivo
F90.2	Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tipo combinado
F90.8	Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, otro tipo
F90.9	Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tipo no especificado
F95.1	Trastorno de tic motor o vocal crónico
F95.2	Trastorno de Tourette
F06.0	Trastorno psicótico debido a otra afección médica (trastorno psicótico con alucinaciones debidas a una afección fisiológica conocida)
F06.2	Trastorno psicótico debido a otra afección médica (trastorno psicótico con ideas delirantes debidas a una afección fisiológica conocida)
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F20.1	Esquizofrenia desorganizada
F20.2	Esquizofrenia catatónica
F20.3	Esquizofrenia no diferenciada
F20.5	Esquizofrenia residual
F20.8	Otra esquizofrenia

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F20.81	Trastorno esquizofreniforme
F20.89	Otra esquizofrenia
F20.9	Esquizofrenia
F21	Trastorno esquizotípico
F25	Trastornos esquizoafectivos
F25.0	Trastorno esquizoafectivo, tipo bipolar
F25.1	Trastorno esquizoafectivo, tipo depresivo
F25.8	Otros trastornos esquizoafectivos
F25.9	Trastorno esquizoafectivo, no especificado
F28	Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado
F29	Trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado
F22	Trastornos delirantes
F23	Trastorno psicótico breve
F24	Trastorno psicótico compartido
F31	Trastorno bipolar
F31.0	Trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco
F31.1	Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin rasgos psicóticos

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F31.10	Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin rasgos psicóticos, no especificado
F31.11	Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin rasgos psicóticos, leve
F31.12	Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin rasgos psicóticos, moderado
F31.13	Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin rasgos psicóticos, grave
F31.2	Trastorno bipolar, episodio actual maníaco grave con rasgos psicóticos
F31.3	Trastorno bipolar, episodio actual depresivo, de gravedad leve o moderada
F31.30	Trastorno bipolar, episodio actual depresivo, de gravedad leve o moderada, no especificado
F31.31	Trastorno bipolar, episodio actual depresivo, leve
F31.32	Trastorno bipolar, episodio actual depresivo, moderado
F31.4	Trastorno bipolar, episodio actual depresivo, grave, sin rasgos psicóticos

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F31.5	Trastorno bipolar, episodio actual depresivo, grave, con rasgos psicóticos
F31.6	Trastorno bipolar, episodio actual combinado
F31.60	Trastorno bipolar, episodio actual combinado, no especificado
F31.61	Trastorno bipolar, episodio actual combinado, leve
F31.62	Trastorno bipolar, episodio actual combinado, moderado
F31.63	Trastorno bipolar, episodio actual combinado, grave, sin rasgos psicóticos
F31.64	Trastorno bipolar, episodio actual combinado, grave, con rasgos psicóticos
F31.7	Trastorno bipolar, actualmente en remisión
F31.71	Trastorno bipolar, en remisión parcial, episodio más reciente hipomaniaco
F31.72	Trastorno bipolar, en remisión total, episodio más reciente hipomaniaco
F31.73	Trastorno bipolar, en remisión parcial, episodio más reciente maniaco
F31.75	Trastorno bipolar, en remisión parcial, episodio más reciente depresivo

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F31.77	Trastorno bipolar, en remisión parcial, episodio más reciente combinado
F31.78	Trastorno bipolar, en remisión total, episodio más reciente combinado
F31.8	Otros trastornos bipolares
F31.81	Trastorno bipolar II
F31.89	Otro trastorno bipolar
F31.9	Trastorno bipolar, no especificado
F34.0	Trastorno ciclotímico
F33.1	Trastorno depresivo mayor, recurrente, moderado
F33.2	Trastorno depresivo mayor, recurrente, grave, sin rasgos psicóticos
F33.3	Trastorno depresivo mayor, recurrente, grave, con síntomas psicóticos
F33.4	Trastorno depresivo mayor, recurrente, en remisión
F33.41	Trastorno depresivo mayor, recurrente, en remisión parcial
F33.8	Otros trastornos depresivos recurrentes
F33.9	Trastorno depresivo mayor, recurrente, no especificado
F34.8	Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo
F06.4	Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F40.0	Agorafobia
F41.0	Trastorno de pánico
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F41.9	Trastorno de ansiedad no especificado
F93	Trastorno de ansiedad por separación
F94	Mutismo selectivo
F06.8	Trastorno obsesivo-compulsivo y relacionado, u otro trastorno mental especificado debido a otra afección médica
F42	Trastorno obsesivo-compulsivo, acumulación y trastornos relacionados
F42.2	(Pensamientos y actos obsesivos combinados)
F42.3	(Trastorno por acumulación)
F42.4	(Trastorno por excoiación [rascar o pellizcar la piel])
F42.8	(Otro trastorno obsesivo-compulsivo)
F42.9	Trastorno obsesivo-compulsivo, no especificado
F45.22	Trastorno dismórfico corporal
F63.3	Tricotilomanía (trastorno de arrancarse el cabello o vello)
F43	Trastorno por estrés agudo

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F43.1	Trastorno por estrés postraumático (PTSD)
F43.12	(PTSD, crónico)
F94.1	Trastorno de apego reactivo
F44.0	Amnesia disociativa
F44.81	Trastorno de identidad disociativo
F44.89	(Otro trastorno disociativo especificado)
F45.22	Trastorno dismórfico corporal
F45.8	(Otro síntoma somático y trastorno relacionado especificados)
F48.1	(Trastornos disociativos. Trastorno de despersonalización/desrealización)
F44.4	Trastorno de conversión con síntoma o déficit motor
F44.5	Trastorno de conversión con crisis epilépticas o convulsiones
F44.6	Trastorno de conversión con síntoma o déficit sensorial
F44.7	Trastorno de conversión con presentación de síntomas combinados
F45.21	Hipocondriasis/(Síntomas somáticos y trastornos relacionados. Trastorno de ansiedad por enfermedad)
F50	Trastornos de la conducta alimentaria

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F50.0	Anorexia nerviosa
F50.01	Anorexia nerviosa, tipo restrictivo
F50.02	Anorexia nerviosa, tipo atracones/purga
F50.2	Bulimia nerviosa
F50.8	(Trastornos de alimentación y de la conducta alimentaria. En adultos)/Otros trastornos de la conducta alimentaria
F50.81	Trastorno de atracones compulsivos
F50.89	(Otro trastorno de alimentación o de la conducta alimentaria especificado)
F98.3	(Trastornos de alimentación y de la conducta alimentaria. En niños) [Pica]
F98.1	Encopresis no debida a una sustancia o afección fisiológica conocida
F64	Disforia de género
F63	Trastornos del control de impulsos
F63.1	Piromanía/(Trastornos disruptivos, de la conducta y del control de impulsos. Piromanía)
F63.2	Cleptomanía
F63.81	Trastorno explosivo intermitente
F91.1	Trastorno de comportamiento disocial, tipo inicio en la infancia

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F91.2	Trastorno de comportamiento disocial, tipo inicio en la adolescencia
F91.3	Trastorno negativista desafiante
F91.8	Otros trastornos de comportamiento disociales
F91.9	Trastorno de comportamiento disocial, no especificado
F10.2*	F10.22-.288 Ahora trastorno por consumo de alcohol moderado, grave, intoxicación con alcohol con síntomas graves, abstinencia de alcohol con síntomas graves, trastornos inducidos por el alcohol
F10.21	Dependencia del alcohol, en remisión
F10.9*	Trastornos inducidos por el alcohol; F10.96 Consumo de alcohol, no especificado con trastorno amnésico persistente inducido por el alcohol
F10.96	Consumo de alcohol, no especificado con trastorno amnésico persistente inducido por el alcohol
F11.1*	Uso de opioides e intoxicación por opioides, leve
F11.2*	Uso de opioides e intoxicación por opioides, grave
F11.20	Dependencia de opioides, sin complicaciones
F11.21	Dependencia de opioides, en remisión
F11.9*	Trastornos inducidos por opioides
F12.2*	Dependencia del cannabis

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F12.20	(Trastornos adictivos y relacionados con sustancias. Moderados, graves)
F13.1*	Abuso relacionado con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.2*	Dependencia relacionada con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
F13.20	Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin complicaciones
F13.21	Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, en remisión
F14.2*	Dependencia de cocaína
F14.20	Dependencia de cocaína, sin complicaciones
F15.2*	Dependencia de otros estimulantes
F15.20	Dependencia de otros estimulantes, sin complicaciones
F15.21	Dependencia de otros estimulantes, en remisión
F16.2*	Dependencia de alucinógenos
F16.20	Dependencia de alucinógenos, sin complicaciones
F16.21	Dependencia de alucinógenos, en remisión
F18.2*	Dependencia de inhalantes
F18.20	Dependencia de inhalantes, sin complicaciones
F18.21	Dependencia de inhalantes, en remisión

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F19.2*	Dependencia de otras sustancias psicoactivas
F19.20	Dependencia de otras sustancias psicoactivas, sin complicaciones
F19.21	Dependencia de otras sustancias psicoactivas, en remisión
F63.0	Ludopatía
F02.811	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, gravedad no especificada, con agitación
F02.818	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, gravedad no especificada, con otra perturbación de la conducta
F02.82	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, gravedad no especificada, con perturbación psicótica
F02.83	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, gravedad no especificada, con perturbación del estado de ánimo
F02.84	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, gravedad no especificada, con ansiedad
F02.A0	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, leve, sin perturbación de la conducta, perturbación psicótica, perturbación del estado de ánimo o ansiedad
F02.A11	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, leve, con agitación

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F02.A18	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, leve, con otra perturbación de la conducta
F02.A2	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, leve, con perturbación psicótica
F02.A3	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, leve, con perturbación del estado de ánimo
F02.A4	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, leve, con ansiedad
F02.B0	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, moderada, sin perturbación de la conducta, perturbación psicótica, perturbación del estado de ánimo o ansiedad
F02.B11	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, moderada, con agitación
F02.B18	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, moderada, con otra perturbación de la conducta
F02.B2	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, moderada, con perturbación psicótica
F02.B3	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, moderada, con perturbación del estado de ánimo
F02.B4	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, moderada, con ansiedad

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F02.C0	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, grave, sin perturbación de la conducta, perturbación psicótica, perturbación del estado de ánimo o ansiedad
F02.C11	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, grave, con agitación
F02.C18	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, grave, con otra perturbación de la conducta
F02.C2	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, grave, con perturbación psicótica
F02.C3	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, grave, con perturbación del estado de ánimo
F02.C4	Demencia en otras enfermedades clasificadas en otro lugar, grave, con ansiedad
F03.911	Demencia no especificada, gravedad no especificada, con agitación
F03.918	Demencia no especificada, gravedad no especificada, con otra perturbación de la conducta
F03.92	Demencia no especificada, gravedad no especificada, con perturbación psicótica
F03.93	Demencia no especificada, gravedad no especificada, con perturbación del estado de ánimo
F03.94	Demencia no especificada, gravedad no especificada, con ansiedad

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F03.A0	Demencia no especificada, leve, sin perturbación de la conducta, perturbación psicótica, perturbación del estado de ánimo o ansiedad
F03.A11	Demencia no especificada, leve, con agitación
F03.A18	Demencia no especificada, leve, con otra perturbación de la conducta
F03.A2	Demencia no especificada, leve, con perturbación psicótica
F03.A3	Demencia no especificada, leve, con perturbación del estado de ánimo
F03.A4	Demencia no especificada, leve, con ansiedad
F03.B0	Demencia no especificada, moderada, sin perturbación de la conducta, perturbación psicótica, perturbación del estado de ánimo o ansiedad
F03.B11	Demencia no especificada, moderada, con agitación
F03.B18	Demencia no especificada, moderada, con otra perturbación de la conducta
F03.B2	Demencia no especificada, moderada, con perturbación psicótica
F03.B3	Demencia no especificada, moderada, con perturbación del estado de ánimo
F03.B4	Demencia no especificada, moderada, con ansiedad

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F03.C0	Demencia no especificada, grave, sin perturbación de la conducta, perturbación psicótica, perturbación del estado de ánimo o ansiedad
F03.C11	Demencia no especificada, grave, con agitación
F03.C18	Demencia no especificada, grave, con otra perturbación de la conducta
F03.C2	Demencia no especificada, grave, con perturbación psicótica
F03.C3	Demencia no especificada, grave, con perturbación del estado de ánimo
F03.C4	Demencia no especificada, grave, con ansiedad
G10	Enfermedad de Huntington
F60	Trastornos específicos de la personalidad
F60.0	Trastorno paranoide de la personalidad
F60.1	Trastorno esquizoide de la personalidad
F60.2	Trastorno antisocial de la personalidad
F60.3	Trastorno límite de la personalidad
F60.4	Trastorno histriónico de la personalidad
F60.5	Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad
F60.6	Trastorno de la personalidad por evitación

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
F60.7	Trastorno de personalidad dependiente
F60.8	Otros trastornos específicos de la personalidad
F60.81	Trastorno de personalidad narcisista
F60.89	Otros trastornos específicos de la personalidad
F60.9	Trastorno de la personalidad, no especificado
F65*	Trastorno parafilico
G04	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis
G04.0	Encefalitis y encefalomiелitis diseminada aguda (ADEM)
G04.3	Encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda
G04.31	Encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda postinfecciosa
G04.32	Encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda posvacuna
G04.8	Otra encefalitis, mielitis y encefalomiелitis
G04.81	Otra encefalitis y encefalomiелitis
G04.9	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis, no especificadas
G04.90	Encefalitis y encefalomiелitis, no especificadas
G05	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedad clasificada en otro lugar

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
G05.3	Encefalitis y encefalomiелitis en enfermedad clasificada en otro lugar
G09	Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central
G11.0	Ataxia congénita no progresiva
G11.1	Ataxia cerebelosa de inicio temprano
G11.10	Ataxia cerebelosa de inicio temprano, no especificada
G11.3	Ataxia cerebelosa con reparación defectuosa del ADN
G11.8	Otras ataxias hereditarias
G12	Atrofia muscular espinal y síndromes relacionados
G12.0	Atrofia muscular espinal del lactante, tipo I [Werdnig-Hoffman]
G12.1	Otra atrofia muscular espinal heredada
G12.2	Enfermedad neuronal motora
G12.21	Esclerosis lateral amiotrófica
G12.25	Atrofia muscular espinal progresiva
G12.29	Otra enfermedad neuronal motora
G12.8	Otras atrofas musculares espinales y síndromes relacionados
G12.9	Atrofia muscular espinal, no especificada

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
G14	Síndrome postpolio
G23	Otras enfermedades degenerativas de los ganglios basales
G23.0	Enfermedad de Hallervorden-Spatz
G23.1	Oftalmoplejia supranuclear progresiva [Steele-Richardson-Olszewski]
G23.2	Degeneración estriatonigral
G23.8	Otras enfermedades degenerativas de los ganglios basales especificadas
G25.82	Síndrome de la persona rígida
G31.81	Enfermedad de Alpers
G31.82	Enfermedad de Leigh
G31.9	Enfermedad degenerativa del sistema nervioso, no especificada
G32.0	Degeneración combinada subaguda de la médula espinal en enfermedades clasificadas en otro lugar
G35	Esclerosis múltiple
G37.2	Mielinolisis pontina central
G37.5	Esclerosis concéntrica [Baló] del sistema nervioso central
G37.8	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central especificadas

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
G37.9	Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, no especificada
G40.0	Epilepsia (focal) (parcial) idiopática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones de inicio localizado
G40.00	Epilepsia (focal) (parcial) idiopática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones de inicio localizado, no resistentes al tratamiento
G40.001	Epilepsia (focal) (parcial) idiopática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones de inicio localizado, no resistentes al tratamiento, con estado epiléptico
G40.009	Epilepsia (focal) (parcial) idiopática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones de inicio localizado, no resistentes al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.011	Epilepsia (focal) (parcial) idiopática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones de inicio localizado, resistentes al tratamiento, con estado epiléptico

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
G40.101	Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones parciales simples, no resistentes al tratamiento, con estado epiléptico
G40.109	Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones parciales simples, no resistentes al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.11	Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones parciales simples, resistentes al tratamiento
G40.2	Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones parciales complejas
G40.209	Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones parciales complejas, no resistentes al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.21	Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones parciales complejas, resistentes al tratamiento

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
G40.219	Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con convulsiones parciales complejas, resistentes al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.3	Epilepsia idiopática generalizada y síndromes epilépticos
G40.30	Epilepsia idiopática generalizada y síndromes epilépticos, no resistentes al tratamiento
G40.301	Epilepsia idiopática generalizada y síndromes epilépticos, no resistentes al tratamiento, con estado epiléptico
G40.309	Epilepsia idiopática generalizada y síndromes epilépticos, no resistentes al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.31	Epilepsia idiopática generalizada y síndromes epilépticos, resistentes al tratamiento
G40.311	Epilepsia idiopática generalizada y síndromes epilépticos, resistentes al tratamiento, con estado epiléptico
G40.319	Epilepsia idiopática generalizada y síndromes epilépticos, resistentes al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.4	Otra epilepsia generalizada y síndromes epilépticos

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
G40.40	Otra epilepsia generalizada y síndromes epilépticos, no resistentes al tratamiento
G40.401	Otra epilepsia generalizada y síndromes epilépticos, no resistentes al tratamiento, con estado epiléptico
G40.409	Otra epilepsia generalizada y síndromes epilépticos, no resistentes al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.41	Otra epilepsia generalizada y síndromes epilépticos, resistentes al tratamiento
G40.411	Otra epilepsia generalizada y síndromes epilépticos, resistentes al tratamiento, con estado epiléptico
G40.419	Otra epilepsia generalizada y síndromes epilépticos, resistentes al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.42	Trastorno por deficiencia de cinasa dependiente de ciclina 5
G40.5	Convulsiones epilépticas relacionadas con causas externas
G40.50	Convulsiones epilépticas relacionadas con causas externas, no resistentes al tratamiento

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
G40.501	Convulsiones epilépticas relacionadas con causas externas, no resistentes al tratamiento, con estado epiléptico
G40.509	Convulsiones epilépticas relacionadas con causas externas, no resistentes al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.511	Síndromes epilépticos especiales, no resistentes al tratamiento, con estado epiléptico
G40.80	Otra epilepsia
G40.801	Otra epilepsia, no resistente al tratamiento, con estado epiléptico
G40.809	Otra epilepsia, no resistente al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.811	Síndrome de Lennox-Gastaut, no resistente al tratamiento, con estado epiléptico
G40.812	Síndrome de Lennox-Gastaut, no resistente al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.813	Síndrome de Lennox-Gastaut, resistente al tratamiento, con estado epiléptico
G40.814	Síndrome de Lennox-Gastaut, resistente al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.819	Otra epilepsia, resistente al tratamiento, sin estado epiléptico

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
G40.82	Espasmos epilépticos
G40.821	Espasmos epilépticos, no resistentes al tratamiento, con estado epiléptico
G40.822	Espasmos epilépticos, no resistentes al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.823	Espasmos epilépticos, resistentes al tratamiento, con estado epiléptico
G40.824	Espasmos epilépticos, resistentes al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.833	Síndrome de Dravet, resistente al tratamiento, con estado epiléptico
G40.834	Síndrome de Dravet, resistente al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.9	Epilepsia, no especificada
G40.90	Epilepsy, no especificada, no resistente al tratamiento
G40.901	Epilepsia, no especificada, no resistente al tratamiento, con estado epiléptico
G40.909	Epilepsia, no especificada, no resistente al tratamiento, sin estado epiléptico
G40.91	Epilepsia, no especificada, resistente al tratamiento
I69.920	Afasia posterior a una enfermedad cerebrovascular no especificada

Código de diagnóstico ICD-10 <i>La afección es difícil, crónica y complicada, independientemente de las características y circunstancias individuales. Como adulto joven con la afección, debe ser elegible en forma automática para los beneficios de Medicaid.</i>	Descripción del código de diagnóstico ICD-10
I69.921	Disfasia posterior a una enfermedad cerebrovascular no especificada
I69.922	Disartria posterior a una enfermedad cerebrovascular no especificada
I69.923	Trastorno de la fluidez posterior a una enfermedad cerebrovascular no especificada
B25.9	Enfermedad por citomegalovirus, no especificada
Q90.2	Trisomía 21
Q90.9	Síndrome de Down, no especificado
Q99.2	Cromosoma X frágil
I169.31	Déficits cognitivos posteriores a un infarto cerebral
*Indica que todos los subcódigos están incluidos.	

You can get this document in other languages, large print, braille or a format you prefer free of charge. Contact the Children & Families programs at 1115waiver.renewal@odhsoha.oregon.gov or 503-945-5772. We accept all relay calls.

Medicaid Division
Children & Families Programs
500 Summer Street, NE
Salem, OR 97301-1097
503-945-5772
Oregon.gov/yshcn

